

Na osnovi odredbi članka 15. stavka 1. točke 4. i članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.), te članka 19. podstavak 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 25. sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 5/05., 19/05., 51/05., 62/05., 90/05. i 116/05. u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i dopunjuje Lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova) na način:

U skupini lijekova A

-iza šifre A02BC01 134 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**A02BC01 135**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "omeprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "6,16", u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Ultop", u stupcu 8. upisuje se tekst: "caps. 28x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "6,16", u stupcu 10. upisuje se broj: "172,34", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "R50^A", dodaje se smjernica: "¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC01 135 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**A02BC01 161**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "omeprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "6,21", u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Pro. Med.CS Praha", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Loseprazol", u stupcu 8. upisuje se tekst: "caps. 14x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "6,21", u stupcu 10. upisuje se broj: "86,93", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "R50^A", dodaje se smjernica: "¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC01 161 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**A02BC01 162**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "omeprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "6,12", u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Pro. Med.CS Praha", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Loseprazol", u stupcu 8. upisuje se tekst: "caps. 28x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "6,12", u stupcu 10. upisuje se broj: "171,27", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "R50^A", dodaje se smjernica: "¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC01 162 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**A02BC02 101**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "pantoprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "40 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "6,14", u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuje se riječ: "Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Zipantola", u stupcu 8. upisuje se tekst: "tbl. 28x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "3,07", u stupcu 10. upisuje se broj: "86,03", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "R50^A", dodaje se smjernica: "¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC02 101 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A02BC02 102**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"pantoprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,06", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zipantola", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 56x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,03", u stupcu 10. upisuje se broj:"169,56", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^A",
dodaje se smjernica:"¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC02 102 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A02BC02 103**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"pantoprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,15", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zipantola", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 14x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,15", u stupcu 10. upisuje se broj:"86,03", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^A",
dodaje se smjernica:"¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC02 103 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A02BC02 104**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"pantoprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,06", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zipantola", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,06", u stupcu 10. upisuje se broj:"169,56", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^A",
dodaje se smjernica:"¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A02BC03 132 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A02BC03 133**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"lanzoprazol¹", u stupcu 3. upisuje se tekst:"30 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,25", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Lanzul", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 28x30 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,25", u stupcu 10. upisuje se broj:"174,88", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^A",
dodaje se smjernica:"¹,^AIndikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger-Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*".

-iza šifre A03BA01 014 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A03BB01 051**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"hioscin-butilbromid", u stupcu 3. upisuje se tekst:"60 mg", a u stupcu 5. upisuje se slovo:"P",

-iza šifre A07EC01 182 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A07EC02 161**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"mesalazin⁷", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1,5 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,72", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Ferring A/S", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Pentasa", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. s prod. djel. 100x500 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,24", u stupcu 10. upisuje se broj:"224,15", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10^G",
dodaju se smjernice:"⁷Indikacija: Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohnovu bolest";
"^GIndikacija: Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohnovu bolest, za povremena i kratkotrajna liječenja težih pogoršanja bolesti, a na preporuku specijalista internista".

-pod šifrom A10AB05 071 u stupcu 7. brišu se riječi:"NovoRapid Novolet" i upisuju riječi:"NovoRapid FlexPen".

-iza šifre A10AC01 086 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AC01 087**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"inzulin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"5,47", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Humulin N Pen", u stupcu 8. upisuje se tekst:"5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"41,00", u stupcu 10. upisuje se broj:"205,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-šifra A10AD01 082 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-iza šifre A10AD01 088 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AD01 089**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"inzulin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"5,47", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Humulin

M3 Pen", u stupcu 8. upisuje se tekst:"5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"47,40", u stupcu 10. upisuje se broj:" 205,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre A10AD01 089 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AD04 081**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"inzulin-lispro", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,33", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Humalog Mix 25", u stupcu 8. upisuje se tekst:"ulošci 5x3 ml (100 i.j./ ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"47,46", u stupcu 10. upisuje se broj:"237,29", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^J", dodaje se smjernica:"^J Indikacija: Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom, po preporuci specijalista dijabetologa".

-iza šifre A10AD04 081 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AD04 082**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"inzulin-lispro", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,99", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Humalog Mix 25 Pen", u stupcu 8. upisuje se tekst:"5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"52,40", u stupcu 10. upisuje se broj:"262,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^J", dodaje se smjernica:"^J Indikacija: Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom, po preporuci specijalista dijabetologa".

-iza šifre A10AD04 082 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AD04 083**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"inzulin-lispro", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,33", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Humalog Mix 50", u stupcu 8. upisuje se tekst:"ulošci 5x3 ml (100 i.j./ ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"47,46", u stupcu 10. upisuje se broj:"237,29", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^J", dodaje se smjernica:"^J Indikacija: Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom, po preporuci specijalista dijabetologa".

-iza šifre A10AD04 083 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10AD04 084**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"inzulin-lispro", u stupcu 3. upisuje se tekst:"40 i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,99", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Eli Lilly", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Humalog Mix 50 Pen", u stupcu 8. upisuje se tekst:"5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"52,40", u stupcu 10. upisuje se broj:"262,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^J", dodaje se smjernica:"^J Indikacija: Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom, po preporuci specijalista dijabetologa".

-pod šiframa A10BA02 171 i A10BA02 172 u stupcu 6. briše se riječ:"Medis" i upisuju riječi:"Weifa AS".

-iza šifre A10BA02 172 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10BA02 173**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"metformin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,40", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Weifa AS", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Aglurab", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 100x500 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,35", u stupcu 10. upisuje se broj:"35,30", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre A10BA02 173 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10BA02 174**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"metformin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,15", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Weifa AS", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Aglurab", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 100x850 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,49", u stupcu 10. upisuje se broj:"48,60", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre A10BB09 171 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**A10BB09 172**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"gliklazid", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Laboratoires Servier", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Diaprel MR", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. s prilag. otpušt. 60x30 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,10", u stupcu 10. upisuje se broj:"66,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50".

-šifra A11CB01 141 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

U skupini lijekova B

-šifra **B01AA08 131** i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-pod šiframa **B01AB06 021, B01AB06 022, B01AB06 023 i B01AB06 024** u stupcu 6. brišu se riječi: "Sanofi Synthelabo Lek" i upisuju riječi: "Glaxo Wellcome Production".

-šifra **B01AB06 025** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-pod šiframa **B01AC16 061 i B01AC16 062** u stupcu 6. brišu se riječi: "Schering-Plough" i upisuju riječi: "Glaxo Wellcome Operations".

-iza šifre **B03BB01 111** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B03XA01 001**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "(*)(++) eritropoetin²¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "1 T i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj: "44,31", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuje se riječ: "Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Epoetal", u stupcu 8. upisuje se tekst: "amp. 5x2.000 i.j./ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "88,62", u stupcu 10. upisuje se broj: "443,12", dodaje se smjernica: "²¹ Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L; 2. anemija sa simptomima hipoksije; 3. (++) eritropoetin: samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi u zdravstvenoj ustanovi izabranog doktora medicine".

-iza šifre **B03XA01 001** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B03XA01 002**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "(*)(++) eritropoetin²¹", u stupcu 3. upisuje se tekst: "1 T i.j.", u stupcu 4. upisuje se broj: "42,45", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuje se riječ: "Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Epoetal", u stupcu 8. upisuje se tekst: "amp. 5x4.000 i.j./ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "169,80", u stupcu 10. upisuje se broj: "848,99", dodaje se smjernica: "²¹ Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L; 2. anemija sa simptomima hipoksije; 3. (++) eritropoetin: samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi u zdravstvenoj ustanovi izabranog doktora medicine".

-pod šiframa **B03XA01 063, B03XA01 064, B03XA01 065, B03XA01 066, B03XA01 073, B03XA01 074, B03XA01 075, B03XA01 076, B03XA01 077, B03XA01 078 i B03XA01 079** smjernica²¹ mijenja se i glasi: "²¹ Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L; 2. anemija sa simptomima hipoksije; 3. (++) eritropoetin: samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi u zdravstvenoj ustanovi izabranog doktora medicine".

-iza šifre **B05AA06 051** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B05AA07 063**", u stupcu 2. upisuju se riječi: "+hidroksietil škrob", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Fresenius Kabi", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Voluven 6%", u stupcu 8. upisuje se tekst: "boca 10x500 ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "49,41", u stupcu 10. upisuje se broj: "494,10".

-iza šifre **B05AA07 063** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B05AA07 064**", u stupcu 2. upisuju se riječi: "+hidroksietil škrob", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Fresenius Kabi", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Voluven 6%", u stupcu 8. upisuje se tekst: "plast. vreć. 15x500 ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "49,41", u stupcu 10. upisuje se broj: "741,15".

-iza šifre **B05BA03 064** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B05BA03 065**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "+glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Baxter S.A", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Glukoza 5% Viaflo", u stupcu 8. upisuje se tekst: "plast. vreć. 50x50ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "5,89", u stupcu 10. upisuje se broj: "294,50".

-iza šifre **B05BA03 065** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B05BA03 071**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "+glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Glukoza 5% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst: "plast. boca 10x100ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "5,88", u stupcu 10. upisuje se broj: "58,77".

-iza šifre **B05BA03 071** u stupcu 1. upisuju se riječi: "**B05BA03 072**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "(+) glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Glukoza 5% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst: "plast. boca 10x250ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "6,24", u stupcu 10. upisuje se broj: "62,37".

-**iza šifre B05BA03 072** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**B05BA03 073**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"(++) glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Glukoza 5% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst:"plast. boca 10x500ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,89", u stupcu 10. upisuje se broj:"68,85".

-**iza šifre B05BA03 073** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**B05BA03 074**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+ glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Glukoza 5% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst:"plast. boca 10x1.000ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"12,95", u stupcu 10. upisuje se broj:"129,50".

-**iza šifre B05BA03 074** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**B05BA03 075**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"(++) glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Glukoza 10% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst:"plast. boca 10x500ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"8,89", u stupcu 10. upisuje se broj:"88,90".

-**iza šifre B05BA03 075** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**B05BA03 076**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+ glukoza", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"B. Braun", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Glukoza 10% Braun", u stupcu 8. upisuje se tekst:"plast. boca 10x1.000ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"15,05", u stupcu 10. upisuje se broj:"150,50".

-**iza šifre B05BB01 066** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**B05BB01 067**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"+natrij-klorid", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Baxter S.A.", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Natrij-klorid 0,9% Viaflo", u stupcu 8. upisuje se tekst:"plast. vreć. 50x50ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,80", u stupcu 10. upisuje se broj:"290,00".

U skupini lijekova C

-**pod šifrom C01BD01 112** u stupcu 7. briše se riječ:"Amlox" i upisuje riječ:"Amiodaron".

-**pod šiframa C01BD01 022 i C01BD01 121** u stupcu 6. brišu se riječi:"Sanofi Synthelabo Lek" i upisuju riječi:"Sanofi Winthrop Industrie".

-**šifra C01DA02 062** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra C01DA02 063** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra C07AB03 011** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**pod šiframa C07AB07 121, C07AB07 122, C07AB07 161, C07AB07 162 i C07AB07 163** smjernica^R mijenja se i glasi:"^RIndikacija: Za hipertenziju i anginu pektoris uz nadoplatu 50%".

-**pod šifrom C09AA03 114** u stupcu 4. briše se broj:"3,04" i upisuje broj:"2,24", u stupcu 9. briše se broj:"1,52" i upisuje broj:"1,12", u stupcu 10. briše se broj:"45,48" i upisuje broj:"33,60".

-**pod šifrom C09AA03 115** u stupcu 4. briše se broj:"1,87" i upisuje broj:"1,38", u stupcu 9. briše se broj:"1,87" i upisuje broj:"1,38", u stupcu 10. briše se broj:"56,10" i upisuje broj:"41,40".

-**pod šifrom C09AA03 116** u stupcu 4. briše se broj:"1,51" i upisuje broj:"1,22", u stupcu 9. briše se broj:"3,01" i upisuje broj:"2,43", u stupcu 10. briše se broj:"90,25" i upisuje broj:"72,90".

-**iza šifre C09AA04 171** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 121**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,90", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x1,25 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,45", u stupcu 10. upisuje se broj:"40,54", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-**iza šifre C09AA05 121** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 122**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,74", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se

riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x2,5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,74", u stupcu 10. upisuje se broj:"48,60", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA05 122 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 123**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,65", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 50x2,5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,65", u stupcu 10. upisuje se broj:"82,45", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA05 123 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 124**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,22", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,44", u stupcu 10. upisuje se broj:"68,28", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA05 124 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 125**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,16", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 50x5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,32", u stupcu 10. upisuje se broj:"115,84", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA05 125 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 126**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,00", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"4,00", u stupcu 10. upisuje se broj:"111,99", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA05 126 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA05 127**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"ramipril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2,5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"0,95", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Sandoz Pharmaceuticals", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Piramil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 50x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,80", u stupcu 10. upisuje se broj:"189,98", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09AA10 162 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09AA10 163**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"trandolapril", u stupcu 3. upisuje se tekst:"2 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,18", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Abbott GmbH", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Gopten", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 28x4 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"4,36", u stupcu 10. upisuje se broj:"122,05", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-pod šifrom C09BA03 112 u stupcu 9. briše se broj:"3,24" i upisuje broj:"2,92", u stupcu 10. briše se broj:"97,33" i upisuje broj:"87,60".

-iza šifre C09BA03 112 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09BA03 121**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"lizinopril+hidroklorotiazid", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Bosnalijek", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Lopril H", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 20x(10 mg+12,5mg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,64", u stupcu 10. upisuje se broj:"32,70", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C09BA03 121 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C09BA03 122**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"lizinopril+hidroklorotiazid", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Bosnalijek", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Lopril H", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 20x(20 mg+12,5mg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,63", u stupcu 10. upisuje se broj:"52,56", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25".

-iza šifre C10AA01 104 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA01 111**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"simvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"15 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,71", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se

5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Simvax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 28x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,46", u stupcu 10. upisuje se broj:"180,81", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA04 162 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 101**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,22", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,22", u stupcu 10. upisuje se broj:"96,66", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 101 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 102**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,90", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,90", u stupcu 10. upisuje se broj:"173,99", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 102 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 103**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,63", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,26", u stupcu 10. upisuje se broj:"157,81", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 103 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 104**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,37", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"4,73", u stupcu 10. upisuje se broj:"284,05", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 104 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 105**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,58", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u

stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"6,31", u stupcu 10. upisuje se broj:"189,25", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 105 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 106**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,42", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Atorvox", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,68", u stupcu 10. upisuje se broj:"340,65", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 122 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 123**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,22", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Tulip", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,22", u stupcu 10. upisuje se broj:"193,32", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 123 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 124**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,63", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Tulip", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,26", u stupcu 10. upisuje se broj:"315,61", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

-iza šifre C10AA05 172 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**C10AA05 173**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"atorvastatin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"10 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,20", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Goedecke GmbH za Pfizer", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Sortis", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"8,80", u stupcu 10. upisuje se broj:"264,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS25;75^T", dodaje se smjernica:"^TIndikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa".

U skupini lijekova G

-iza šifre G03FB05 183 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**G03FB05 184**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"estradiol+noretisteron", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Novo

Nordisk", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Novofem", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 1x28", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,48", u stupcu 10. upisuje se broj:"41,40", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R25"

-iza šifre G03GA05 071 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**G03GA08 071**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+korigonadotropin³²", u stupcu 3. upisuje se tekst:"250 mcg", u stupcu 4. upisuje se broj:"256,42", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Serono", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Ovitrelle", u stupcu 8. upisuje se tekst:"lio boč. 1x250 mcg", u stupcu 9. upisuje se broj:"256,42", u stupcu 10. upisuje se broj:"256,42", dodaje se smjernica:"³²Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa".

-iza šifre G03GA08 071 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**G03GA08 072**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+korigonadotropin³²", u stupcu 3. upisuje se tekst:"250 mcg", u stupcu 4. upisuje se broj:"256,42", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Serono", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Ovitrelle", u stupcu 8. upisuje se tekst:"šprica 1x250 mcg", u stupcu 9. upisuje se broj:"256,42", u stupcu 10. upisuje se broj:"256,42", dodaje se smjernica:"³²Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa".

U skupini lijekova H

-iza šifre H01BA02 052 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**H01BA02 161**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"dezmopresin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,4 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"17,60", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Ferring AB", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Minirin", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl.30x0,2 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"8,80", u stupcu 10. upisuje se broj:"264,08", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS*", dodaje se smjernica:"*Indikacija: Samo u slučajevima kongestije nosne sluznice, ozljede ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije ili epistakse".

-pod šifrom H01BA02 761 smjernica^{AG} mijenja se i glasi:"^{AG}Po preporuci specijalista internista endokrinologa ili pedijatra".

-pod šifrom H01BA02 761 u stupcu 6. brišu se riječi:"Byk Gulden" i upisuju riječi:"Ferring AB".

-šifra H02AB06 161 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra H02AB06 162 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra H02AB06 163 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

U skupini lijekova J

-iza šifre J01CR02 006 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01CR02 074**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"(+amoksicilin+klavulanska kiselina)", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"19,34" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"SmithKline Beecham", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Augmentin", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč. 5x(1.000+200 mg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"19,34", u stupcu 10. upisuje se broj:"96,72".

-iza šifre J01CR02 074 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01CR02 075**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"(+amoksicilin+klavulanska kiselina)", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"15,48" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"SmithKline Beecham", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Augmentin", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč. 1x(2.000+200 mg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"30,95", u stupcu 10. upisuje se broj:"30,95".

-šifra J01DA09 112 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra J01DA09 114 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra J01DA09 115 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra J01DA09 216 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-pod šifrom J01DA13 022 u stupcu 4. briše se broj:"98,92" i upisuje broj:"89,02", u stupcu 9. briše se broj:"49,46" i upisuje broj:"44,51", u stupcu 10. briše se broj:"494,64" i upisuje broj:"445,14".

-šifra **J01FA09 111** i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra **J01FA09 313** i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-iza šifre **J01FA10 306** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01FA10 308**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"azitromicin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"22,67" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Sumamed", u stupcu 8. upisuje se tekst:"sirup forte 15 ml (200 mg/5 ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"45,35", u stupcu 10. upisuje se broj:"45,35", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"**RAK**", dodaje se smjernica:"**AK**Indikacija: Infekcije respiratornog sustava, infekcije s gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis, streptokokne infekcije mekih česti; azitromicin je indiciran pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), te pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (*H. influenzae*) i infekcije želuca i dvanaesnika s *Helicobacter pylori*".

-iza šifre **J01FA10 308** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01FA10 309**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"azitromicin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"21,68" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Sumamed", u stupcu 8. upisuje se tekst:"sirup 1.200 XL 37,5 ml (200 mg/5 ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"108,38", u stupcu 10. upisuje se broj:"108,38", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"**RAK**", dodaje se smjernica:"**AK**Indikacija: Infekcije respiratornog sustava, infekcije s gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis, streptokokne infekcije mekih česti; azitromicin je indiciran pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), te pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (*H. influenzae*) i infekcije želuca i dvanaesnika s *Helicobacter pylori*".

-pod šiframa **J01MA02 101, J01MA02 102, J01MA02 103, J01MA02 131, J01MA02 132, J01MA02 141 i J01MA02 142** smjernica^{AL} mijenja se i glasi:"^{AL}Indikacija: Kronični bakterijski prostatitis, komplicirana infekcija mokraćnog sustava, dijabetičko stopalo i osteomijelitis, po preporuci specijalista".

-iza šifre **J01MA02 142** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01MA02 061**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+ciprofloksacin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,5 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"124,70" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Alkaloid Skopje", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Cital", u stupcu 8. upisuje se tekst:" konc. otop. za inf. amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"24,94", u stupcu 10. upisuje se broj:"124,70".

-iza šifre **J01MA02 061** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01MA02 161**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+ciprofloksacin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"15,64" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Alkaloid Skopje", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Cital", u stupcu 8. upisuje se tekst:" tbl. 10x250 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,91", u stupcu 10. upisuje se broj:"39,10", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"**RS25^{AL}**", dodaje se smjernica:"^{AL}Indikacija: Kronični bakterijski prostatitis, komplicirana infekcija mokraćnog sustava, dijabetičko stopalo i osteomijelitis, po preporuci specijalista".

-iza šifre **J01MA02 161** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01MA02 162**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+ciprofloksacin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"14,96" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Alkaloid Skopje", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Cital", u stupcu 8. upisuje se tekst:" tbl. 10x500 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"7,48", u stupcu 10. upisuje se broj:"74,80" a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"**RS25^{AL}**", dodaje se smjernica:"^{AL}Indikacija: Kronični bakterijski prostatitis, komplicirana infekcija mokraćnog sustava, dijabetičko stopalo i osteomijelitis, po preporuci specijalista".

-iza šifre **J01MA14 141** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J01MA14 142**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"moksifloksacin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,4 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"20,87" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Bayer Pharma Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Avelox", u stupcu 8. upisuje se tekst:" film tbl. 7x400 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"20,87", u stupcu 10. upisuje se broj:"146,09", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"**R25^{AM}**", dodaje se smjernica:"^{AM}Indikacija: Za infekcije donjeg dijela respiratornog sustava i za akutnu bakterijsku upalu paranazalnih sinusa, u osoba starijih od 18 godina, nakon neuspjeha liječenja beta-laktamskim antibioticima i makrolidima".

-šifra **J02AA01 051** i podaci u stupcima od 1-5 brišu se u potpunosti.

-pod šifrom J02AA01 052 u stupcu 1. brišu se riječi:"**J02AA01 052**" i upisuju se riječi:"**J02AA01 061**", u stupcu 4. upisuje se broj:"804,85", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Torrex Pharma", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Amphocil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč.1x50 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1.149,78", u stupcu 10. upisuje se broj:"1.149,78", dodaje se smjernica:"*Indikacija: Za sustavne gljivične infekcije u bolesnika koji ne podnose amfotericin B poradi nuspojave ili imaju oštećenu bubrežnu funkciju u stacionarnim ustanovama uz odobrenje Zavoda, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove".

-iza šifre J02AA01 061 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AA01 062**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+amfotericin B (koloidni)*", u stupcu 3. upisuje se tekst:"35 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"717,09" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Torrex Pharma", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Amphocil", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč.1x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2.048,82", u stupcu 10. upisuje se broj:"2.048,82", dodaje se smjernica:"*Indikacija: Za sustavne gljivične infekcije u bolesnika koji ne podnose amfotericin B poradi nuspojave ili imaju oštećenu bubrežnu funkciju u stacionarnim ustanovama uz odobrenje Zavoda, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove".

-iza šifre J02AB02 131 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 101**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"57,20" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zenafluk", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 7x50 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"14,30", u stupcu 10. upisuje se broj:"100,07", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre J02AB02 101 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 102**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"55,46" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zenafluk", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 7x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"27,73", u stupcu 10. upisuje se broj:"194,14", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre J02AC01 102 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 103**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"43,29" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Zenafluk", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 1x150 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"32,47", u stupcu 10. upisuje se broj:"32,47", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre J02AC01 103 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 011**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"95,35" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Flukonax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"inf. boč. 100 ml (2mg/ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"95,35", a u stupcu 10. upisuje se broj:"95,35".

-iza šifre J02AC01 011 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 112**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"57,20" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Flukonax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 7x50 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"14,30", u stupcu 10. upisuje se broj:"100,07", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre J02AC01 112 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 113**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"55,46" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Flukonax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 7x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"27,73", u stupcu 10. upisuje se broj:"194,14", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre J02AC01 113 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 114**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"43,29" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Flukonax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 1x150 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"32,47", u stupcu 10. upisuje se broj:"32,47", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-**iza šifre J02AC01 114** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**J02AC01 115**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"flukonazol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,2 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"49,92" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Jadran Gal. labor.", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Flukonax", u stupcu 8. upisuje se tekst:"caps. 7x200 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"49,92", u stupcu 10. upisuje se broj:"349,45", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-**šifra J05AB01 111** i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AB01 213** i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF02 171** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF02 172** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF02 173** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF02 174** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF04 181** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**šifra J05AF04 182** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

U skupini lijekova L

-**šifra L01BA01 065** i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-**pod šifrom L01CD01 001** u stupcu 9. briše se broj:"774,66" i upisuje broj:"689,45", u stupcu 10. briše se broj:"774,66" i upisuje broj:"689,45".

-**pod šifrom L01CD01 002** u stupcu 9. briše se broj:"2.165,66" i upisuje broj:"1.862,47", u stupcu 10. briše se broj:"2.165,66" i upisuje broj:"1.862,47".

-**pod šifrom L01CD01 061** u stupcu 9. briše se broj:"924,07" i upisuje broj:"780,08", u stupcu 10. briše se broj:"924,07" i upisuje broj:"780,08".

-**pod šifrom L01CD01 062** u stupcu 9. briše se broj:"3.001,36" i upisuje broj:"2.180,82", u stupcu 10. briše se broj:"3.001,36" i upisuje broj:"2.180,82".

-**pod šiframa L01CD01 001, L01CD01 002, L01CD01 061 i L01CD01 062** smjernica⁵⁵ mijenja se i glasi:⁵⁵Indikacija: 1. Prva linija kemoterapije raka jajnika u kombinaciji s karboplatinom ili cisplatinom; stadij bolesti II., III. i IV.; 2. Druga linija kemoterapije raka jajnika nakon neuspjeha kemoterapije prve linije; 3. Druga linija kemoterapije metastatskog raka dojke nakon neuspjeha kemoterapije prve linije (rezistencija na antracikline); 4. Druga linija kemoterapije lokalno uznapređovalog (stadij III) i metastatskog raka pluća ne-malih stanica (stadij IV) u kombinaciji s platinskim spojem. 5. Adjuvantna, sekvencijska primjena paklitaksela u bolesnica s rakom dojke (4 ciklusa) nakon standardne adjuvantne kemoterapije AC (4 ciklusa) u bolesnica s pozitivnim aksilarnim limfnim čvorovima i negativnim hormonskim receptorima.

Liječenje paklitakselom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: ECOG status: ECOG 0-1: prva linija kemoterapije; ECOG 0-2: druga linija kemoterapije; nepostojanje presadnica u CNS-u; postojanje samih koštanih promjena nije indikacija za primjenu paklitaksela, razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; razina AST, ALT < 5 gornja granica uredne vrijednosti; klirens kreatinina >50 ml/min; razina neutrofila >1.5x10³ /mm³ ; razina trombocita >100x10³/mm³. Odobravaju se dva ciklusa liječenja paklitakselom nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest)».

-**iza šifre L01CD01 062** u stupcu 1. upisuju se riječi:"**L01CD01 071**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"(*)paklitaxel⁵⁵", u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Ebewe Pharma", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Paklitaxel Ebewe", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč.1x30 mg/5 ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"689,45", u stupcu 10. upisuje se broj:"689,45", dodaje se smjernica:⁵⁵Indikacija: 1. Prva linija kemoterapije raka jajnika u kombinaciji s karboplatinom ili cisplatinom; stadij bolesti II., III. i IV.; 2. Druga linija kemoterapije raka jajnika nakon neuspjeha kemoterapije prve linije; 3. Druga linija kemoterapije metastatskog raka dojke nakon neuspjeha kemoterapije prve linije (rezistencija na antracikline); 4. Druga linija kemoterapije lokalno uznapređovalog (stadij III) i metastatskog raka pluća ne-malih stanica (stadij IV) u kombinaciji s platinskim spojem. 5. Adjuvantna, sekvencijska primjena paklitaksela u bolesnica s rakom dojke (4 ciklusa) nakon standardne adjuvantne kemoterapije AC (4 ciklusa) u bolesnica s pozitivnim aksilarnim limfnim čvorovima i negativnim hormonskim receptorima.

Liječenje paklitakselom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: ECOG status: ECOG 0-1: prva linija kemoterapije; ECOG 0-2: druga linija kemoterapije; nepostojanje presadnica u CNS-u; postojanje samih koštanih promjena nije indikacija za primjenu paklitaksela, razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; razina AST, ALT < 5 gornja granica uredne vrijednosti; klirens kreatinina >50 ml/min; razina neutrofila >1.5x10³ /mm³ ; razina trombocita >100x10³/mm³. Odobravaju se dva ciklusa liječenja paklitakselom nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora.

Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

-iza šifre L01CD01 071 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**L01CD01 072**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "(*)paklitaksel⁵⁵", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Ebewe Pharma", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Paklitaxel Ebewe", u stupcu 8. upisuje se tekst: "boč. 1x150 mg/25 ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "2.793,70", u stupcu 10. upisuje se broj: "2.793,70", dodaje se smjernica: ⁵⁵Indikacija: 1. Prva linija kemoterapije raka jajnika u kombinaciji s karboplatinom ili cisplatinom; stadij bolesti II., III. i IV.; 2. Druga linija kemoterapije raka jajnika nakon neuspjeha kemoterapije prve linije; 3. Druga linija kemoterapije metastatskog raka dojke nakon neuspjeha kemoterapije prve linije (rezistencija na antracikline); 4. Druga linija kemoterapije lokalno uznapredovalog (stadij III) i metastatskog raka pluća ne-malih stanica (stadij IV) u kombinaciji s platinom i etoposidom. 5. Adjuvantna, sekvencijska primjena paklitaksela u bolesnica s rakom dojke (4 ciklusa) nakon standardne adjuvantne kemoterapije AC (4 ciklusa) u bolesnica s pozitivnim aksilarnim limfnim čvorovima i negativnim hormonskim receptorima. Liječenje paklitakselom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: ECOG status: ECOG 0-1: prva linija kemoterapije; ECOG 0-2: druga linija kemoterapije; nepostojanje presadnica u CNS-u; postojanje samih koštanih promjena nije indikacija za primjenu paklitaksela, razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; razina AST, ALT < 5 gornja granica uredne vrijednosti; klirens kreatinina >50 ml/min; razina neutrofila >1.5x10³ /mm³; razina trombocita >100x10³/mm³. Odobravaju se dva ciklusa liječenja paklitakselom nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

-iza šifre L01DA01 051 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**L01DB01 001**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "+doksorubicin", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Pliva Lachema", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Doksorubicin Pliva", u stupcu 8. upisuje se tekst: "boč. 1x10mg/5 ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "54,00", u stupcu 10. upisuje se broj: "54,00".

-iza šifre L01DB01 001 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**L01DB01 002**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "+doksorubicin", u stupcu 5. upisuje se slovo: "P", u stupcu 6. upisuju se riječi: "Pliva Lachema", u stupcu 7. upisuju se riječi: "Doksorubicin Pliva", u stupcu 8. upisuje se tekst: "boč. 1x50mg/25 ml", u stupcu 9. upisuje se broj: "270,00", u stupcu 10. upisuje se broj: "270,00".

-pod šifrom L02AB01 163 smjernica^{AP}mijenja se i glasi: "^{AP}Po preporuci bolničkog specijalista; očekivano preživljenje više od 6 mjeseci; mogućnost peroralne prehrane (isključuju se bolesnici s tumorima jednjaka ili želuca kod kojih je peroralna prehrana nemoguća); dijagnoza kaheksije u bolesnika s zloćudnom bolesti; primjena terapije tijekom 6 tjedana, te nakon navedenog perioda obvezatna reevaluacija statusa težine bolesnika. Samo bolesnici s porastom tjelesne mase smiju nastaviti započeto liječenje; primjena nije dozvoljena u bolesnika s presadnicama u CNS; maksimalna doza je do 400 mg".

-pod šiframa L02AE04 072 i L02AE04 073 u stupcu 6. brišu se riječi: "Byk Gulden" i upisuju riječi: "Ferring GmbH".

-pod šiframa L04AA01 161, L04AA01 162, L04AA01 163, L04AA01 172, L04AA01 173, L04AA01 174, L04AA01 264 i L04AA01 271 smjernica^{67, AU} mijenja se i glasi: "^{67, AU}Samo za bolesnike nakon transplantacije i isključivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve načine liječenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju i Zavoda za kliničku imunologiju KBC-a Zagreb i u bolesnika s idiopatskim nefrotskim sindromom".

-iza šifre L04AA05 052 u stupcu 1. brišu se riječi: "**L04AA05 151**" i upisuju riječi: "**L04AA05 161**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "takrolimus*", u stupcu 3. upisuje se tekst: "5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "81,25" u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuje se riječ: "Fujisawa", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Prograf", u stupcu 8. upisuje se tekst: "caps. 60x1mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "16,25", u stupcu 10. upisuje se broj: "974,70", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "RS**", dodaje se smjernica: "*, **" Indikacija: 1. primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. liječenje odbacivanja presatka bubrega, koje je rezistentno na konvencionalnu imunosupresivnu terapiju i/ili kod nepodnošljivosti terapije ciklosporinom, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja".

-iza šifre L04AA05 161 u stupcu 1. upisuju se riječi: "**L04AA05 162**", u stupcu 2. upisuje se riječ: "takrolimus⁷⁶", u stupcu 3. upisuje se tekst: "5 mg", u stupcu 4. upisuje se broj: "74,92" u stupcu 5. upisuje se slovo: "O", u stupcu 6. upisuje se riječ: "Fujisawa", u stupcu 7. upisuje se riječ: "Prograf", u stupcu 8. upisuje se tekst: "caps. 30x5mg", u stupcu 9. upisuje se broj: "74,92", u stupcu 10. upisuje se broj: "2.247,50", a u stupcu 11. upisuje se oznaka: "RS**", dodaje se smjernica: "*, **" Indikacija: 1. primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. liječenje odbacivanja presatka bubrega, koje je rezistentno na konvencionalnu

imunosupresivnu terapiju i/ili kod nepodnošljivosti terapije ciklosporinom, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja".

U skupini lijekova M

-pod širom M01AE03 113 u stupcu 8. briše se tekst:"tbl. 20x150 mg" i upisuje tekst:"retard tbl. 20x150 mg".

U skupini lijekova N

-iza šifre N02AA01 041 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AA01 042**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"(++)morfin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"30 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"12,75" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Alkaloid Skopje", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Morfin hidroklorid Alkaloid", u stupcu 8. upisuje se tekst:"amp. 10x4 mg/ ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,70", u stupcu 10. upisuje se broj:"16,99".

-šifra N02AA01 071 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra N02AA01 072 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-iza šifre N02AX02 146 u stupcu 1. upisuju se riječi:" **N02AX02 148**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"7,56" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal retard", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 50x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,52", u stupcu 10. upisuje se broj:"126,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N02AX02 148 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AX02 149**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"7,40" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal retard", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x150 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,70", u stupcu 10. upisuje se broj:"110,97", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N02AX02 161 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AX02 162**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,66" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal retard", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 50x150 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,33", u stupcu 10. upisuje se broj:"166,50", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N02AX02 162 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AX02 163**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"7,88" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal retard", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 30x200 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,25", u stupcu 10. upisuje se broj:"157,50", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N02AX02 163 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AX02 164**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"7,10" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal retard", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 50x200 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"4,73", u stupcu 10. upisuje se broj:"236,25", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N02AX02 242 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N02AX02 247**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+tramadol", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"6,24" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Grünenthal GmbH", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Tramal", u stupcu 8. upisuje se tekst:"boč. 96 ml (100mg/ml)", u stupcu 9. upisuje se broj:"199,93", u stupcu 10. upisuje se broj:"199,93", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-pod šiframa N03AG01 121 i N03AG01 122 u stupcu 6. brišu se riječi:"Sanofi Synthelabo Lek" i upisuju riječi:"Sanofi Winthrop Industrie".

-iza šifre N03AX09 174 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N03AX11 101**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"topiram⁷⁷", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"24,84" u stupcu 5.

upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Epiramat", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x25 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,07", u stupcu 10. upisuje se broj:"124,04", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^{BA}", dodaje se smjernica:"^{77,BA} Indikacija: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 77), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra".

-iza šifre N03AX11 101 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N03AX11 102**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"topiramat⁷⁷", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"21,00" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Epiramat", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x50 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,50", u stupcu 10. upisuje se broj:"210,00", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^{BA}", dodaje se smjernica:"^{77,BA} Indikacija: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 77), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra".

-iza šifre N03AX11 102 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N03AX11 103**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"topiramat⁷⁷", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"16,41" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Epiramat", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,47", u stupcu 10. upisuje se broj:"328,44", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^{BA}", dodaje se smjernica:"^{77,BA} Indikacija: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 77), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra".

-iza šifre N03AX11 103 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N03AX11 104**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"topiramat⁷⁷", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"18,60" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Pliva", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Epiramat", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 60x200 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"12,40", u stupcu 10. upisuje se broj:"744,24", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS^{BJ}", dodaje se smjernica:"^{77,BA} Indikacija: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 77), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra".

-pod šiframa N03AX11 181, N03AX11 182, N03AX11 183 i N03AX11 184 u stupcu 6. brišu se riječi:"Janssen Cilag" i upisuju riječi:"Cilag AG".

-iza šifre N04BA02 191 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N04BA02 192**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"levodopa+benzerazid", u stupcu 3. upisuje se tekst:"0,3 g", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,79" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Hoffmann-La Roche", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Madopar LIQ 125", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. za oral. susp. 100x(100mg+25mg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,79", u stupcu 10. upisuje se broj:"79,05", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS*", dodaje smjernica:"RS* U bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa".

-pod šiframa N04BA02 191 i N04BA02 193 u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS*", dodaje smjernica:"* U bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa".

-šifra N05AC02 171 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra N05AC02 172 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra N05AC02 173 i podaci u stupcima 1-11 brišu se u potpunosti.

-šifra N05AH03 066 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-pod šiframa N05AH03 111, N05AH03 112, N05AH03 161, N05AH03 162, N05AH03 163, N05AH03 164, N05AH04 161, N05AH04 162, N05AX08 101, N05AX08 102, N05AX08 103, N05AX08 104, N05AX08 181, N05AX08 185, N05AX08 186, N05AX08 187 i N05AX08 288

smjernica^{BD} mijenja se i glasi:"^{BD}Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije (uključujući klopazin), po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja".

-iza šifre N05BA12 113 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N05BA12 114**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+alprazolam", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"0,80" u stupcu 5.

upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Belupo", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Misar SR", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 30x0,5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,40", u stupcu 10. upisuje se broj:"11,94", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50".

-iza šifre N05BA12 114 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N05BA12 115**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+alprazolam", u stupcu 3. upisuje se tekst:"1 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"0,59" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuje se riječ:"Belupo", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Misar SR", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 30x1 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,59", u stupcu 10. upisuje se broj:"17,67", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50".

-iza šifre N05CD08 062 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N05CD08 063**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+midazolam", u stupcu 3. upisuje se tekst:"15 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"16,50" u stupcu 5. upisuje se slovo:"P", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Hoffmann-La Roche", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Dormicum", u stupcu 8. upisuje se tekst:"amp. 10x5mg/ ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,50", u stupcu 10. upisuje se broj:"55,00".

-iza šifre N05CD08 063 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N05CD08 164**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"+midazolam", u stupcu 3. upisuje se tekst:"15 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"1,72" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Hoffmann-La Roche", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Dormicum", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 10x7,5 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"0,86", u stupcu 10. upisuje se broj:"8,55".

-pod šiframa N05CF02 101, N05CF02 102, N05CF02 121 i N05CF02 122 u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R*", dodaje smjernica:"**Indikacija: Samo za kratkotrajno liječenje nesаницe**".

-iza šifre N06AB04 101 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 121**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,84" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 28x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,42", u stupcu 10. upisuje se broj:"39,82", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB04 121 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 122**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,56" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 56x10 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,28", u stupcu 10. upisuje se broj:"71,68", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB04 122 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 123**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,84" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 28x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,84", u stupcu 10. upisuje se broj:"79,63", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB04 123 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 124**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,56" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 56x20 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,56", u stupcu 10. upisuje se broj:"143,33", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB04 124 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 125**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,84" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 28x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,69", u stupcu 10. upisuje se broj:"159,26", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB04 125 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB04 126**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"citalopram", u stupcu 3. upisuje se tekst:"20 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,56" u stupcu 5.

upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Lek Ljubljana", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Citalon", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl. 56x40 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,12", u stupcu 10. upisuje se broj:"286,67", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R".

-iza šifre N06AB05 112 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB06 131**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"sertralin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"50 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,15" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Asentra", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x50 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,15", u stupcu 10. upisuje se broj:"88,20", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre N06AB06 131 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**N06AB06 132**", u stupcu 2. upisuje se riječ:"sertralin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"50 mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"2,84" u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Asentra", u stupcu 8. upisuje se tekst:"tbl. 28x100 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,67", u stupcu 10. upisuje se broj:"158,76", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R10".

-iza šifre "N06AX11 113", u stupcu 1. upisuje se šifra:"**N06AX11 131**" u stupcu 2. upisuje se riječ:"mirtazapin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"30mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,69", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Mirzaten", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl.30x30 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,69", u stupcu 10. upisuje se broj:"110,70", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50".

-iza šifre "N06AX11 131", u stupcu 1. upisuje se šifra:"**N06AX11 132**" u stupcu 2. upisuje se riječ:"mirtazapin", u stupcu 3. upisuje se tekst:"30mg", u stupcu 4. upisuje se broj:"3,69", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Krka Novo Mesto", u stupcu 7. upisuje se riječ:"Mirzaten", u stupcu 8. upisuje se tekst:"film tbl.30x45 mg", u stupcu 9. upisuje se broj:"5,54", u stupcu 10. upisuje se broj:"166,05", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50".

U skupini lijekova R

-iza šifre R03AK06 363 u stupcu 1. upisuje se šifra:"**R03AK06 364**" u stupcu 2. upisuju se riječi:"salmeterol+flutikazon", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Glaxo Wellcome", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Seretide 50 inhaler", u stupcu 8. upisuje se tekst:"aerosol 120x(25 mcg+50mcg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"1,76", u stupcu 10. upisuje se broj:"210,94", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^{BH}", dodaje se smjernica:"^{BH} Samo za bolesnike s III i IV stadijem bronhalne astme".

-iza šifre R03AK06 364 u stupcu 1. upisuje se šifra:"**R03AK06 365**" u stupcu 2. upisuju se riječi:"salmeterol+flutikazon", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Glaxo Wellcome", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Seretide 125 inhaler", u stupcu 8. upisuje se tekst:"aerosol 120x(25 mcg+125mcg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"2,20", u stupcu 10. upisuje se broj:"264,22", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^{BH}", dodaje se smjernica:"^{BH} Samo za bolesnike s III i IV stadijem bronhalne astme".

-iza šifre R03AK06 365 u stupcu 1. upisuje se šifra:"**R03AK06 366**" u stupcu 2. upisuju se riječi:"salmeterol+flutikazon", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Glaxo Wellcome", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Seretide 250 inhaler", u stupcu 8. upisuje se tekst:"aerosol 120x(25 mcg+250mcg)", u stupcu 9. upisuje se broj:"3,12", u stupcu 10. upisuje se broj:"373,97", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"R50^{BH}", dodaje se smjernica:"^{BH} Samo za bolesnike s III i IV stadijem bronhalne astme".

U skupini lijekova V

-pod širom V06DX03 391 u stupcu 8. briše se tekst:"boca 1.000 ml" i upisuje tekst:"boca 1x250ml".

-iza šifre V06DX03 391 u stupcu 1. upisuju se riječi:"**V06DX03 392**", u stupcu 2. upisuju se riječi:"namirnice za enteralnu primjenu⁹¹", u stupcu 5. upisuje se slovo:"O", u stupcu 6. upisuju se riječi:"Abbott Laboratories", u stupcu 7. upisuju se riječi:"Pulmocare RTH", u stupcu 8. upisuje se

tekst:"boca 1x500 ml", u stupcu 9. upisuje se broj:"15,98", u stupcu 10. upisuje se broj:"15,98", a u stupcu 11. upisuje se oznaka:"RS50^{BR}", dodaje se smjernica:"⁹¹Indikacija: Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.^{BR}Po preporuci bolničkog specijalista".

-šifra V08AA12 073 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB02 084 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB02 085 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB02 088 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB04 061 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB04 062 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB07 083 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08AB07 084 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

-šifra V08CA03 083 i podaci u stupcima 1-10 brišu se u potpunosti.

Na kraju Liste lijekova tekst:

"Lijekovi označeni s **RS** obvezuje izabranog doktora da prilikom propisivanja lijeka na recept upiše u za to predviđenu rubriku na receptu: šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio", zamjenjuje se tekstem:

"Lijekovi označeni s **RS**-doktor specijalist obvezan je lijek preporučiti po nezaštićenom (generičkom) imenu,

-izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obvezan je prilikom propisivanja lijeka na recept upisati šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio u za to predviđenu rubriku na receptu".

Članak 2.

Izmjene i dopune navedene u članku 1. ove Odluke sadržane su u Tabličnom prikazu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. siječnja 2006. godine.

Klasa: 025-04/05-01/328

Ur.broj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 21. prosinca 2005. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med.

Tablični prikaz Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova Zavoda

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A	Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari									R
A02BC01 135	omeprazol ¹	20 mg	6,16	O	Krka Novo Mesto	Uktop	caps. 28x20 mg	6,16	172,34	R50 ^A
A02BC01 161	omeprazol ¹	20 mg	6,21	O	Pro. Med.CS Praha	Loseprazol	caps. 14x20 mg	6,21	86,93	R50 ^A
A02BC01 162	omeprazol ¹	20 mg	6,12	O	Pro. Med.CS Praha	Loseprazol	caps. 28x20 mg	6,12	171,27	R50 ^A
A02BC02 101	pantoprazol ¹	40 mg	6,14	O	Pliva	Zipantola	tbl. 28x20 mg	3,07	86,03	R50 ^A
A02BC02 102	pantoprazol ¹	40 mg	6,06	O	Pliva	Zipantola	tbl. 56x20 mg	3,03	169,56	R50 ^A
A02BC02 103	pantoprazol ¹	40 mg	6,15	O	Pliva	Zipantola	tbl. 14x40 mg	6,15	86,03	R50 ^A
A02BC02 104	pantoprazol ¹	40 mg	6,06	O	Pliva	Zipantola	tbl. 28x40 mg	6,06	169,56	R50 ^A
A02BC03 133	lanzoprazol ¹	30 mg	6,25	O	Krka Novo Mesto	Lanzul	caps. 28x30 mg	6,25	174,88	R50 ^A
A03BB01 051	hioscin-butilbromid	60 mg	-	P						
A07EC02 161	mesalazin ⁷	1,5 g	6,72	O	Ferring A/S	Pentasa	tbl. s prod. djel. 100x500 mg	2,24	224,15	RS10 ^G
A10AC01 087	inzulin	40 i.j.	5,47	P	Eli Lilly	Humulin N Pen	5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)	41,00	205,00	R
A10AD01 089	inzulin	40 i.j.	5,47	P	Eli Lilly	Humulin M3 Pen	5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3ml (100i.j./ml)	41,00	205,00	R
A10AD04 081	inzulin-lispro	40 i.j.	6,33	P	Eli Lilly	Humalog Mix 25	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ ml)	47,46	237,29	RS ^J
A10AD04 082	inzulin-lispro	40 i.j.	6,99	P	Eli Lilly	Humalog Mix25 Pen	5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)	52,40	262,00	RS ^J
A10AD04 083	inzulin-lispro	40 i.j.	6,33	P	Eli Lilly	Humalog Mix 50	ulošci 5x3 ml (100 i.j./ ml)	47,46	237,29	RS ^J
A10AD04 084	inzulin-lispro	40 i.j.	6,99	P	Eli Lilly	Humalog Mix 50 Pen	5 pen-štrcalj. sa stakl. ulošcima 3 ml (100i.j./ml)	52,40	262,00	RS ^J
A10BA02 173	metformin	2 g	1,40	O	Weifa AS	Aglurab	film tbl. 100x500 mg	0,35	35,30	R
A10BA02 174	metformin	2 g	1,15	O	Weifa AS	Aglurab	film tbl. 100x850 mg	0,49	48,60	R
A10BB09 172	gliklazid	-	-	O	Laboratoires Servier	Diaprel MR	tbl. s prilag. otpušt. 60x30 mg	1,10	66,00	R50
B	Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe									R

¹; ^A Indikacija: Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore, refluks ezofagitis i Zollinger- Ellisonov sindrom i za eradikaciju *Helicobacter pylori*.

⁷ Indikacija: Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohnovu bolest.

^G Indikacija: Za bolesnike s ulceroznim kolitisom koji ne podnose sulfasalazin i za Crohnovu bolest, za povremena i kratkotrajna liječenja težih pogoršanja bolesti, a na preporuku specijalista internista.

^J Indikacija: Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s neregularnom glikemijom, po preporuci specijalista dijabetologa.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B03XA01 001	(*) (++) eritropoetin ²¹	1 T i.j.	44,31	P	Pliva	Epoetal	amp. 5 x2.000i.j/ml	88,62	443,12	
B03XA01 002	(*) (++) eritropoetin ²¹	1 T i.j.	42,45	P	Pliva	Epoetal	amp. 5 x4.000i.j/ml	169,80	848,99	
B05AA07 063	+ hidroksetil škrob	-	-	P	Fresenius Kabi	Voluven 6%	boca 10x500 ml	49,41	494,10	
B05AA07 064	+ hidroksetil škrob	-	-	P	Fresenius Kabi	Voluven 6%	plast. vreć. 15x500 ml	49,41	741,15	
B05BA03 065	+ glukoza	-	-	P	Baxter S.A.	Glukoza 5% Viaflo	plast. vreć. 50x50ml	5,89	294,50	
B05BA03 071	+ glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 5% Braun	plast. boca 10x100ml	5,88	58,77	
B05BA03 072	(+) glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 5% Braun	plast. boca 10x250ml	6,24	62,37	
B05BA03 073	(++) glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 5% Braun	plast. boca 10x500ml	6,89	68,85	
B05BA03 074	+ glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 5% Braun	plast. boca 10x1000ml	12,95	129,50	
B05BA03 075	(++) glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 10% Braun	plast. boca 10x500ml	8,89	88,90	
B05BA03 076	+ glukoza	-	-	P	B. Braun	Glukoza 10% Braun	plast. boca 10x1000ml	15,05	150,50	
B05BB01 067	+ natrij-klorid	-	-	P	Baxter S.A.	Natrij-klorid 0,9% Viaflo	plast. vreć. 50x50ml	5,80	290,00	
C	Lijekovi s djelovanjem na srce i krvžilje									R
C09AA03 114	lizinopril	10 mg	2,24	O	Belupo	IruMED	tbl. 30x5 mg	1,12	33,60	R25
C09AA03 115	lizinopril	10 mg	1,38	O	Belupo	IruMED	tbl. 30x10 mg	1,38	41,40	R25
C09AA03 116	lizinopril	10 mg	1,22	O	Belupo	IruMED	tbl. 30x20 mg	2,43	72,90	R25
C09AA05 121	ramipril	2,5 mg	2,90	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 28x1,25 mg	1,45	40,54	R25
C09AA05 122	ramipril	2,5 mg	1,74	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 28x2,5 mg	1,74	48,60	R25
C09AA05 123	ramipril	2,5 mg	1,65	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 50x2,5 mg	1,65	82,45	R25
C09AA05 124	ramipril	2,5 mg	1,22	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 28x5 mg	2,44	68,28	R25
C09AA05 125	ramipril	2,5 mg	1,16	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 50x5 mg	2,32	115,84	R25
C09AA05 126	ramipril	2,5 mg	1,00	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 28x10 mg	4,00	111,99	R25
C09AA05 127	ramipril	2,5 mg	0,95	O	Sandoz Pharmaceuticals	Piramil	tbl. 50x10 mg	3,80	189,98	R25
C09AA10 163	trandolapril	2 mg	2,18	O	Abbott GmbH	Gopten	caps. 28x4 mg	4,36	122,05	R25

²¹ Primjenjuje se u svim centrima gdje se provodi dijaliza: 1. bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L; 2. anemija sa simptomima hipoksije; 3. (++) eritropoetin: samo za bolesnike na peritonejskoj dijalizi u zdravstvenoj ustanovi izabranog doktora medicine.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
C09BA03 112	lizinopril+hidroklorotiazid	-	-	O	Belupo	Iruzid	tbl. 30x(20 mg+12,5mg)	2,92	87,60	R25
C09BA03 121	lizinopril+hidroklorotiazid	-	-	O	Bosnalijek	Lopril H	tbl. 20x (10 mg+12,5mg)	1,64	32,70	R25
C09BA03 122	lizinopril+hidroklorotiazid	-	-	O	Bosnalijek	Lopril H	tbl. 20x(20 mg+12,5mg)	2,63	52,56	R25
C10AA01 111	simvastatin	15 mg	3,71	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 20x10 mg	2,47	49,37	RS25;75 ^T
C10AA01 112	simvastatin	15 mg	3,43	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 28x10 mg	2,29	64,14	RS25;75 ^T
C10AA01 113	simvastatin	15 mg	2,78	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 20x20 mg	3,70	73,94	RS25;75 ^T
C10AA01 114	simvastatin	15 mg	2,78	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 28x20 mg	3,70	103,51	RS25;75 ^T
C10AA01 115	simvastatin	15 mg	2,42	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 20x40 mg	6,46	129,24	RS25;75 ^T
C10AA01 116	simvastatin	15 mg	2,42	O	Jadran Gal. labor.	Simvax	film tbl. 28x40 mg	6,46	180,81	RS25;75 ^T
C10AA05 101	atorvastatin	10 mg	3,22	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 30x10 mg	3,22	96,66	RS25;75 ^T
C10AA05 102	atorvastatin	10 mg	2,90	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 60x10 mg	2,90	173,99	RS25;75 ^T
C10AA05 103	atorvastatin	10 mg	2,63	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 30x20 mg	5,26	157,81	RS25;75 ^T
C10AA05 104	atorvastatin	10 mg	2,37	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 60x20 mg	4,73	284,05	RS25;75 ^T
C10AA05 105	atorvastatin	10 mg	1,58	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 30x40 mg	6,31	189,25	RS25;75 ^T
C10AA05 106	atorvastatin	10 mg	1,42	O	Pliva	Atorvox	film tbl. 60x40 mg	5,68	340,65	RS25;75 ^T
C10AA05 123	atorvastatin	10 mg	3,22	O	Lek Ljubljana	Tulip	film tbl. 60x10 mg	3,22	193,32	RS25;75 ^T
C10AA05 124	atorvastatin	10 mg	2,63	O	Lek Ljubljana	Tulip	film tbl. 60x20 mg	5,26	315,61	RS25;75 ^T
C10AA05 173	atorvastatin	10 mg	2,20	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	film tbl. 30x40 mg	8,80	264,00	RS25;75 ^T
G	Lijekovi s djelovanjem na mokraćni sustav i spolni hormoni									
G03FB05 184	estradiol+noretisteron	-	-	O	Novo Nordisk	Novofem	film tbl. 1x28	1,48	41,40	R25
G03GA08 071	+ koriogonadotropin ³²	250 mcg	256,42	P	Serono	Ovitrelle	lio boč. 1x250 mcg	256,42	256,42	
G03GA08 072	+ koriogonadotropin ³²	250 mcg	256,42	P	Serono	Ovitrelle	šprica 1x250 mcg	256,42	256,42	

^T Indikacija: 1. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja i za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L, daje se uz nadoplatu od 25%. 2. U primarnoj prevenciji uz nadoplatu 75% od cijene u bolesnika čiji je desetogodišnji rizik od koronarne bolesti srca veći od 20% i/ili će premašiti 20% s dobi od 60 godina (prema tablici koronarnog rizika Treće zajedničke radne skupine Europskog kardiološkog i drugih društava). Terapija se može započeti u bolesnika mlađih od 70 godina, po preporuci specijalista internista i neurologa.

³² Po preporuci specijalista ginekologa ili endokrinologa.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
H	Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim lučenjem (izuzev spolnih hormona)									
H01BA02 161	dezmpresin	0,4 mg	17,60	O	Ferring AB	Minirin	tbl. 30x0,2 mg	8,80	264,08	RS*
J	Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)									
J01CR02 074	(+) amoksicilin+klavulanska kiselina	1 g	19,34	P	SmithKline Beecham	Augmentin	boč. 5x(1.000+200 mg)	19,34	96,72	
J01CR02 075	(+) amoksicilin+klavulanska kiselina	1 g	15,48	P	SmithKline Beecham	Augmentin	boč. 1x(2.000+200 mg)	30,95	30,95	
J01DA13 022	+ ceftriakson ³⁸	2 g	89,02	P	Lek Ljubljana	Lendacin	boč. 10x1 g	44,51	445,14	
J01FA10 308	azitromicin	0,3 g	22,67	O	Pliva	Sumamed	sirup forte 15 ml (200 mg/5 ml)	45,35	45,35	R ^{AK}
J01FA10 309	azitromicin	0,3 g	21,68	O	Pliva	Sumamed	sirup 1.200 XL 37,5 ml (200 mg/5 ml)	108,38	108,38	R ^{AK}
J01MA02 061	+ ciprofloksacin	0,5 g	124,70	P	Alkaloid Skopje	Citeral	konc. otop. za inf. amp. 5x10 ml (100 mg/10 ml)	24,94	124,70	
J01MA02 161	+ ciprofloksacin	1 g	15,64	O	Alkaloid Skopje	Citeral	tbl. 10x250 mg	3,91	39,10	RS25 ^{AL}
J01MA02 162	+ ciprofloksacin	1 g	14,96	O	Alkaloid Skopje	Citeral	tbl. 10x500 mg	7,48	74,80	RS25 ^{AL}
J01MA14 142	moksifloksacin	0,4 g	20,87	O	Bayer Pharma Ljubljana	Avelox	film tbl. 7x400 mg	20,87	146,09	R25 ^{AM}
J02AA01 061	+ amfotericin B (koloidni)**	35 mg	804,85	P	Torrex Pharma	Amphocil	boč. 1x50 mg	1.149,78	1.149,78	
J02AA01 062	+ amfotericin B (koloidni)**	35 mg	717,09	P	Torrex Pharma	Amphocil	boč. 1x100 mg	2.048,82	2.048,82	

* Indikacija: Samo u slučajevima kongestije nosne sluznice, ozljede ili anomalija nosa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije ili epistakse.

³⁸ Samo kao rezervni antibiotik.

^{AK} Indikacija: Infekcije respiratornog sustava, infekcije s gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis, streptokokne infekcije mekih česti; azitromicin je indiciran pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), te pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (*H. influenzae*) i infekcije želuca i dvanaesnika s *Helicobacter pylori*.

^{AL} Indikacija: Kronični bakterijski prostatitis, komplicirana infekcija mokraćnog sustava, dijabetičko stopalo i osteomijelitis, po preporuci specijalista.

^{AM} Indikacija: Za infekcije donjeg dijela respiratornog sustava i za akutnu bakterijsku upalu paranazalnih sinusa, u osoba starijih od 18 godina, nakon neuspjeha liječenja beta-laktamskim antibioticima i makrolidima.

** Indikacija: Za sustavne gljivične infekcije u bolesnika koji ne podnose amfotericin B poradi nuspojava ili imaju oštećenu bubrežnu funkciju u stacionarnim ustanovama uz odobrenje Zavoda, na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
J02AC01 101	flukonazol	0,2 g	57,20	O	Pliva	Zenafluk	caps. 7x50 mg	14,30	100,07	R10
J02AC01 102	flukonazol	0,2 g	55,46	O	Pliva	Zenafluk	caps. 7x100 mg	27,73	194,14	R10
J02AC01 103	flukonazol	0,2 g	43,29	O	Pliva	Zenafluk	caps. 1x150 mg	32,47	32,47	R10
J02AC01 011	flukonazol	0,2 g	95,35	O	Jadran Gal. labor.	Fluconax	inf. boč. 100 ml (2mg/ml)	95,35	95,35	
J02AC01 112	flukonazol	0,2 g	57,20	O	Jadran Gal. labor.	Fluconax	caps. 7x50 mg	14,30	100,07	R10
J02AC01 113	flukonazol	0,2 g	55,46	O	Jadran Gal. labor.	Fluconax	caps. 7x100 mg	27,73	194,14	R10
J02AC01 114	flukonazol	0,2 g	43,29	O	Jadran Gal. labor.	Fluconax	caps. 1x150 mg	32,47	32,47	R10
J02AC01 115	flukonazol	0,2 g	49,92	O	Jadran Gal. labor.	Fluconax	caps. 7x200 mg	49,92	349,45	R10
L	Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav									
L01CD01 001	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Pliva	Paklitaxel Pliva	boč. 1x30 mg/5 ml	689,45	689,45	
L01CD01 002	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Pliva	Paklitaxel Pliva	boč. 1x100 mg/16,7 ml	1.862,47	1.862,47	
L01CD01 061	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Bristol-Myers Squibb	Taxol	boč. 1x30 mg/5 ml	780,08	780,08	
L01CD01 062	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Bristol-Myers Squibb	Taxol	boč. 1x100 mg/16,7 ml	2.180,82	2.180,82	
L01CD01 071	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Ebewe Pharma	Paklitaxel Ebewe	boč. 1x30 mg/5 ml	689,45	689,45	
L01CD01 072	(*) paklitaksel ⁵⁵	-	-	P	Ebewe Pharma	Paklitaxel Ebewe	boč. 1x150 mg/25 ml	2.793,70	2.793,70	
L01DB01 001	+ doksorubicin	-	-	P	Pliva Lachema	Doksorubicin Pliva	boč. 1x10mg/5 ml	54,00	54,00	
L01DB01 002	+ doksorubicin	-	-	P	Pliva Lachema	Doksorubicin Pliva	boč. 1x50mg/25 ml	270,00	270,00	
L04AA05 161	takrolimus*	5 mg	81,25	O	Fujisawa	Prograf	caps. 60x1mg	16,25	974,70	RS**
L04AA05 162	takrolimus*	5 mg	74,92	O	Fujisawa	Prograf	caps. 30x5mg	74,92	2.247,50	RS**
N	Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav									

⁵⁵ Indikacija: 1. Prva linija kemoterapije raka jajnika u kombinaciji s karboplatinom ili cisplatinom; stadij bolesti II., III. i IV.; 2. Druga linija kemoterapije raka jajnika nakon neuspjeha kemoterapije prve linije; 3. Druga linija kemoterapije metastatskog raka dojke nakon neuspjeha kemoterapije prve linije (rezistencija na antracikline); 4. Druga linija kemoterapije lokalno uznapredovalog (stadij III) i metastatskog raka pluća ne-malih stanica (stadij IV) u kombinaciji s platinskim spojem. 5. Adjuvantna, sekvencijska primjena paklitaksela u bolesnica s rakom dojke (4 ciklusa) nakon standardne adjuvantne kemoterapije AC (4 ciklusa) u bolesnica s pozitivnim aksilarnim limfnim čvorovima i negativnim hormonskim receptorima. Liječenje paklitakselom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: ECOG status: ECOG 0-1: prva linija kemoterapije; ECOG 0-2: druga linija kemoterapije; nepostojanje presadnica u CNS-u; postojanje samih koštanih promjena nije indikacija za primjenu paklitaksela, razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti; razina AST, ALT < 5 gornja granica uredne vrijednosti; klirens kreatinina >50 ml/min; razina neutrofila >1.5x10³ /mm³ ; razina trombocita >100x10³/mm³. Odobravaju se dva ciklusa liječenja paklitakselom nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguće je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).

*,** Indikacija: 1. primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. liječenje odbacivanja presatka bubrega, koje je rezistentno na konvencionalnu imunosupresivnu terapiju i/ili kod nepodnošljivosti terapije ciklosporinom, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog liječenja parenteralnim oblikom. 77; BA Indikacija: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (svi na koje se ne odnosi smjernica 77), po preporuci specijalista neurologa i pedijatra.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
N02AA01 042	(++) morfin	30 mg	12,75	P	Alkaloid Skopje	Morfin hidroklorid Alkaloid	amp. 10x4 mg/ ml	1,70	16,99	
N02AX02 148	+ tramadol	0,3 g	7,56	O	Grünenthal GmbH	Tramal retard	film tbl. 50x100 mg	2,52	126,00	R
N02AX02 149	+ tramadol	0,3 g	7,40	O	Grünenthal GmbH	Tramal retard	film tbl. 30x150 mg	3,70	110,97	R
N02AX02 162	+ tramadol	0,3 g	6,66	O	Grünenthal GmbH	Tramal retard	film tbl. 50x150 mg	3,33	166,50	R
N02AX02 163	+ tramadol	0,3 g	7,88	O	Grünenthal GmbH	Tramal retard	film tbl. 30x200 mg	5,25	157,50	R
N02AX02 164	+ tramadol	0,3 g	7,10	O	Grünenthal GmbH	Tramal retard	film tbl. 50x200 mg	4,73	236,25	R
N02AX02 247	+ tramadol	0,3 g	6,24	O	Grünenthal GmbH	Tramal	boč. 96 ml (100mg/ ml)	199,93	199,93	R
N03AX11 101	topiram ⁷⁷	0,3 g	24,84	O	Pliva	Epiramat	film tbl. 60x25 mg	2,07	124,04	RS ^{BA}
N03AX11 102	topiram ⁷⁷	0,3 g	21,00	O	Pliva	Epiramat	film tbl. 60x50 mg	3,50	210,00	RS ^{BA}
N03AX11 103	topiram ⁷⁷	0,3 g	16,41	O	Pliva	Epiramat	film tbl. 60x100 mg	5,47	328,44	RS ^{BA}
N03AX11 104	topiram ⁷⁷	0,3 g	18,60	O	Pliva	Epiramat	film tbl. 60x200 mg	12,40	744,24	RS ^{BA}
N04BA02 192	levodopa+benzerazid	0,6 g	3,79	O	Hoffmann-La Roche	Madopar LIQ 125	tbl. za oral. susp. 100x(100mg+25mg)	0,79	79,05	RS*
N05BA12 114	+ alprazolam	1 mg	0,80	O	Belupo	Misar SR	tbl. 30x0,5 mg	0,40	11,94	R50
N05BA12 115	+ alprazolam	1 mg	0,59	O	Belupo	Misar SR	tbl. 30x1mg	0,59	17,67	R50
N05CD08 063	+ midazolam	15 mg	16,50	P	Hoffmann-La Roche	Dormicum	amp. 10x5mg/ ml	5,50	55,00	
N05CD08 164	+ midazolam	15 mg	1,72	O	Hoffmann-La Roche	Dormicum	tbl. 10x7,5mg	0,86	8,55	
N06AB04 121	citalopram	20 mg	2,84	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 28x10 mg	1,42	39,82	R
N06AB04 122	citalopram	20 mg	2,56	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 56x10 mg	1,28	71,68	R
N06AB04 123	citalopram	20 mg	2,84	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 28x20 mg	2,84	79,63	R
N06AB04 124	citalopram	20 mg	2,56	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 56x20 mg	2,56	143,33	R
N06AB04 125	citalopram	20 mg	2,84	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 28x40 mg	5,69	159,26	R
N06AB04 126	citalopram	20 mg	2,56	O	Lek Ljubljana	Citalon	film tbl. 56x40 mg	5,12	286,67	R
N06AB06 131	sertralín	50 mg	3,15	O	Krka Novo Mesto	Asentra	tbl. 28x50 mg	3,15	88,20	R10
N06AB06 132	sertralín	50 mg	2,84	O	Krka Novo Mesto	Asentra	tbl. 28x100 mg	5,67	158,76	R10
N06AX11 131	mirtazapín	30 mg	3,69	O	Krka Novo Mesto	Mirzaten	film tbl. 30x30 mg	3,69	110,70	R50
N06AX11 132	mirtazapín	30 mg	3,69	O	Krka Novo Mesto	Mirzaten	film tbl. 30x45 mg	5,54	166,05	R50
R	Lijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa									

* Indikacija: U bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa.

Šifra ATK	Nezaštićeno ime (generičko ime) - INN	DDD i jed. mj.	Cijena u kn za DDD	Nač. primj.	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik lijeka	Cijena u kn za jed. oblika (kom.)	Cijena u kn za orig. pakir	R
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
R03AK06 364	salmeterol+flutikazon	-	-	O	Glaxo Wellcome	Seretide 50 inhaler	aerosol 120x (25 mcg+50mcg)	1,76	210,94	R50 BH
R03AK06 365	salmeterol+flutikazon	-	-	O	Glaxo Wellcome	Seretide 125 inhaler	aerosol 120x (25 mcg+125mcg)	2,20	264,22	R50 BH
R03AK06 366	salmeterol+flutikazon	-	-	O	Glaxo Wellcome	Seretide 250 inhaler	aerosol 120x (25 mcg+250mcg)	3,12	373,97	R50 BH
V06	Nutrijencije i umjetna sladila									
V06DX03 391	namirnice za enteralnu primjenu ⁹¹	-	-	O	Abbott Laboratories	Pulmocare RTH	boca 1x250 ml	8,92	8,92	RS50 BR
V06DX03 392	namirnice za enteralnu primjenu ⁹¹	-	-	O	Abbott Laboratories	Pulmocare RTH	boca 1x500 ml	15,98	15,98	RS50 BR

BH Samo za bolesnike s III i IV stadijem bronhalne astme.

⁹¹ Indikacija: Za bolesnike s teškom kroničnom respiracijskom insuficijencijom, poglavito za bolesnike s cističnom fibrozom.

BR Po preporuci bolničkog specijalista.